


CONVESSITÀ E CONTINUITÀ

- ① Una funzione convessa, è per forza continua? NO
- ② Se è continua e convessa, è per forza lip.? NO

Esempi



convessa in $[0, 1]$, ma
non continua



$f(x) = 1 - \sqrt{x}$ è convessa e cont.
in $[0, 1]$, ma non lip.

Teorema 1 Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ convesso, e sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ convessa.
Allora $f(x)$ è continua in $\text{Int}(A)$.

Dim. Prendo $x_0 \in \text{Int}(A)$ e dim. che esiste il limite in x_0 .

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\downarrow} \cdot \underbrace{(x - x_0)}_{\downarrow}$$

Per $x \rightarrow x_0^+$

$$f'_+(x_0) \in \mathbb{R} \quad 0 = 0$$

Per $x \rightarrow x_0^-$

$$f'_-(x_0) \in \mathbb{R} \quad 0 = 0$$

Quindi $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$, da cui la continuità

— 0 — 0 —

Teorema 2 (Locale Lipschitzianità)

Siano $a < c < d < b$ e sia



$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa.

Allora f è Lipschitziana in $[c, d]$

Dim. Prendiamo due p.ti qualunque
 $c \leq x < y \leq d$.

Allora

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = r(x, y) \leq r(x, b) \leq r(d, b)$$

$\uparrow$ Monot. 2^a variabile $\uparrow$ Monot. 1^a variabile

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = r(x, y) \geq r(a, y) \geq r(a, c)$$

I due estremi non dipendono da x e y . Quindi

$$r(a, c) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq r(d, b)$$

Fatto generale: se $A \leq X \leq B$, allora $|X| \leq \max\{|A|, |B|\}$
(si dimostra distinguendo i casi $X \geq 0$ e $X \leq 0$: percorso!)

Ma allora

$$\frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} \leq \max\{|r(d, b)|, |r(a, c)|\} =: L$$


e questo dice che $f(x)$ è Lip. in $[c, d]$

— o — o —

Oss. In pratica sto dicendo che
il rapporto incrementale tra x e y
si controlla con quelli

- tra a e c
- tra d e b .

— o — o —



CONVESSITÀ E DERIVATA PRIMA

- ① Una funzione convessa può non essere derivabile in alcuni pti
 $f(x) = |x|$
- ② Una funzione convessa ammette sempre derivata dx e sx
nei pti $x_0 \in \text{Int}(A)$ (sul bordo non è detto)

Teorema (Monotonia delle derivate destra e sinistra)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ convesso e sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ convessa.

Siano $x_0 \in \text{Int}(A)$ e $y_0 \in \text{Int}(A)$ con $x_0 < y_0$.

Allora

$$f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq f'_-(y_0) \leq f'_+(y_0)$$

Dim. Tanto per cambiare, è il lemma
dei 3 rapporti incrementali

Per h positivo piccolo

$$\Delta(x_0, x_0+h) \leq \Delta(x_0, y_0)$$

quindi

$$f'_+(x_0) \leq \Delta(x_0, y_0)$$


Analogamente per h positivo piccolo

$$\Delta(x_0, y_0) \leq \Delta(y_0-h, y_0)$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$
$$\Delta(x_0, y_0) \leq f'_-(y_0)$$

Di conseguenza ho ottenuto che

$$f'_+(x_0) \leq \Delta(x_0, y_0) \leq f'_-(y_0)$$



Corollario Supponiamo che f sia derivabile in A .

Allora

f è convessa $\Leftrightarrow f'(x)$ è debolmente crescente


Dim. $\Rightarrow$ Teorema precedente visto che $f' = f'_+ = f'_-$

↑ Aggiunto dopo VIDEO: RIFATTA MEGLIO ALLA LEZIONE 118

$\Leftarrow$ Dalla monotonia della derivata segue il Lemma dei 3 rapporti incrementali, o per lo meno segue il confronto

$$\lambda(a,b) \leq \lambda(b,c)$$

perché sono derivata in punti intermedi (via Lagrange)



$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(x) dx$$

$$f(c) = f(a) + \int_a^c f'(x) dx = f(a) + \int_a^b f'(x) dx + \int_b^c f'(x) dx$$

Devo dimostrare che

$$f(b) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda) f(c)$$

$$= \frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c)$$

Sostituendo $f(a) + \int_a^b \dots \leq \frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} (f(a) + \int_a^b + \int_b^c)$

Semplifico e se ue va $f(a)$ e resta

$$\int_a^b f'(x) dx \leq \frac{b-a}{c-a} \int_a^b f'(x) dx + \frac{b-a}{c-a} \int_b^c f'(x) dx$$

$$\left(1 - \frac{b-a}{c-a}\right) \int_a^b f'(x) dx \leq \frac{b-a}{c-a} \int_b^c f'(x) dx$$

$$\frac{c-b}{c-a} \int_a^b f'(x) dx \leq \frac{b-a}{c-a} \int_b^c f'(x) dx$$

$$\underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f'(x) dx}_{\text{valore di } f'(x) \text{ in un p.to tra } a \text{ e } b} \leq \underbrace{\frac{1}{c-b} \int_b^c f'(x) dx}_{\text{valore di } f'(x) \text{ in un p.to tra } b \text{ e } c}$$

valore di $f'(x)$ in
un p.to tra a e b

valore di $f'(x)$ in
un p.to tra b e c
— 0 — 0 —

FINE PARTE RIFATTA
MEGLIO (?) ALLA
LEZIONE 118

Moralmente Le funzioni convesse stanno sopra la retta tangente.

Teorema Sia A convesso, sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ convessa.

Sia $x_0 \in \text{Int}(A)$ e sia $m \in [f'_-(x_0), f'_+(x_0)]$

Allora

$$f(x) \geq \underbrace{f(x_0) + m(x - x_0)}_{\substack{\text{retta per } (x_0, f(x_0)) \\ \text{con coeff. ang. } m}} \quad \forall x \in A$$

[Dim.] Solito lemma. Se $x > x_0$ devo dim. che

$$\underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{\approx (x_0, x)}} \geq m$$

$$\approx (x_0, x) \geq f'_+(x_0) \geq m$$

Se $x < x_0$, devo dim. che $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq m$

$$\underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\approx (x, x_0)} \leq f'_-(x_0) \leq m$$

Disegno

