Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: ACBB DADB ACCD

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$
(A) vale 1, **(B)** vale 0, **(C)** vale $+\infty$, **(D)** non esiste.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x - \cos y$ il punto $(0,0)$ **(A)** è un massimo locale, **(B)** non è un punto critico, **(C)** è un minimo locale, **(D)** è un punto sella.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) π, **(B)** $\frac{1}{2}$, **(C)** 0, **(D)** 1.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) nessuno di questi, **(B)** $[1,+\infty)$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** $[-1,1]$.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(B)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(C)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(D)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \log(x^2+1)\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \pi$, **(B)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(C)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(D)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un centro, **(B)** un nodo improprio, **(C)** un nodo (non improprio), **(D)** un fuoco.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) positivo, **(B)** nullo, **(C)** non definito, **(D)** negativo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(B)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(C)** tutto $\mathbb{R}$, **(D)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b).

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\log 3$, **(B)** $\frac{1}{3}$, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** 0.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) pari, **(B)** dispari, **(C)** periodica, **(D)** costante.

12. Sia $f \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può esistere ma sicuramente non è continua, **(B)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(C)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(D)** f non può esistere.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: CCAD ADBC ABDB

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4}{x^2+y^2}$$
(A) vale 1, **(B)** vale 0, **(C)** vale $+\infty$, **(D)** non esiste.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) è un massimo locale, **(B)** è un minimo locale, **(C)** è un punto sella, **(D)** non è un punto critico.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) 1, **(B)** 0, **(C)** π, **(D)** $\frac{1}{2}$.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) $(-\infty,-1]$, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $[1,+\infty)$, **(D)** nessuno di questi.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(B)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(C)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(D)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \operatorname{arctg}(x^4+1)\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(B)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(C)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(D)** $y(x) = \pi$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo (non improprio), **(B)** un fuoco, **(C)** un centro, **(D)** un nodo improprio.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) positivo, **(B)** negativo, **(C)** nullo, **(D)** non definito.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(B)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(C)** tutto $\mathbb{R}$, **(D)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) 0, **(B)** $e^5 - e^1$, **(C)** $\log 3$, **(D)** $\frac{1}{3}$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) pari, **(B)** periodica, **(C)** dispari, **(D)** costante.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f non può esistere, **(B)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(C)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(D)** f può esistere ma sicuramente non è continua.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: BACA BDDA CCDB

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{x^4}$$
(A) vale 1, **(B)** non esiste, **(C)** vale 0, **(D)** vale $+\infty$.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) non è un punto critico, **(B)** è un punto sella, **(C)** è un massimo locale, **(D)** è un minimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) 1, **(B)** $\frac{1}{2}$, **(C)** 0, **(D)** π.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) $[1,+\infty)$, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** nessuno di questi.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(B)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(C)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(D)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \log(x^2+1)\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(B)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(C)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(D)** $y(x) = \pi$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo improprio, **(B)** un fuoco, **(C)** un nodo (non improprio), **(D)** un centro.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) nullo, **(B)** non definito, **(C)** negativo, **(D)** positivo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(B)** tutto $\mathbb{R}$, **(C)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(D)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b).

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** 0, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** $\log 3$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) dispari, **(B)** pari, **(C)** costante, **(D)** periodica.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(B)** f non può esistere, **(C)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(D)** f può esistere ma sicuramente non è continua.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: DACD CBAD CBAB

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$
(A) non esiste, **(B)** vale 1, **(C)** vale 0, **(D)** vale $+\infty$.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x - \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) è un punto sella, **(B)** non è un punto critico, **(C)** è un minimo locale, **(D)** è un massimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) π, **(B)** 0, **(C)** $\frac{1}{2}$, **(D)** 1.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) nessuno di questi, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** $[1,+\infty)$.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(B)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(C)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(D)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \operatorname{arctg}(x^4+1)\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(B)** $y(x) = \pi$, **(C)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(D)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo improprio, **(B)** un fuoco, **(C)** un centro, **(D)** un nodo (non improprio).

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) negativo, **(B)** non definito, **(C)** positivo, **(D)** nullo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) tutto $\mathbb{R}$, **(B)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(C)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(D)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b).

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\log 3$, **(B)** $e^5 - e^1$, **(C)** 0, **(D)** $\frac{1}{3}$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) costante, **(B)** pari, **(C)** periodica, **(D)** dispari.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f non può esistere, **(B)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(C)** f può esistere ma sicuramente non è continua, **(D)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: CDDB CDAA CABB

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$
(A) non esiste, **(B)** vale 0, **(C)** vale $+\infty$, **(D)** vale 1.

2. Per la funzione $f(x,y) = \sin x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) non è un punto critico, **(B)** è un massimo locale, **(C)** è un punto sella, **(D)** è un minimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) 0, **(B)** 1, **(C)** $\frac{1}{2}$, **(D)** π.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = \frac{x^2}{k}$ converge uniformemente?
(A) $[-1,1]$, **(B)** nessuno di questi, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** $[1,+\infty)$.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(B)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(C)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(D)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \sqrt{x^2+1}\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(B)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(C)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(D)** $y(x) = \pi$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo (non improprio), **(B)** un fuoco, **(C)** un nodo improprio, **(D)** un centro.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) nullo, **(B)** negativo, **(C)** positivo, **(D)** non definito.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(B)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(C)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(D)** tutto $\mathbb{R}$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** $e^5 - e^1$, **(C)** 0, **(D)** $\log 3$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) dispari, **(B)** pari, **(C)** costante, **(D)** periodica.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(B)** f non può esistere, **(C)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(D)** f può esistere ma sicuramente non è continua.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: ACBA DADC DBBC

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$
(A) vale 1, **(B)** vale $+\infty$, **(C)** vale 0, **(D)** non esiste.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) è un massimo locale, **(B)** non è un punto critico, **(C)** è un punto sella, **(D)** è un minimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) π, **(B)** 0, **(C)** $\frac{1}{2}$, **(D)** 1.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) $(-\infty,-1]$, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $[1,+\infty)$, **(D)** nessuno di questi.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(B)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(C)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(D)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \sqrt{x^2+1}\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \pi$, **(B)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(C)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(D)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un centro, **(B)** un nodo (non improprio), **(C)** un fuoco, **(D)** un nodo improprio.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) non definito, **(B)** negativo, **(C)** nullo, **(D)** positivo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(B)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(C)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(D)** tutto $\mathbb{R}$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** $\log 3$, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** 0.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) periodica, **(B)** pari, **(C)** dispari, **(D)** costante.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f non può esistere, **(B)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(C)** f può esistere ma sicuramente non è continua, **(D)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: CCCB AADD DABB

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{x^4}$$
(A) vale 1, **(B)** vale 0, **(C)** non esiste, **(D)** vale $+\infty$.

2. Per la funzione $f(x,y) = \sin x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) è un minimo locale, **(B)** è un punto sella, **(C)** è un massimo locale, **(D)** non è un punto critico.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) 0, **(B)** π, **(C)** 1, **(D)** $\frac{1}{2}$.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) nessuno di questi, **(B)** $(-\infty,-1]$, **(C)** $[-1,1]$, **(D)** $[1,+\infty)$.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(B)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(C)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(D)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \sqrt{x^2+1}\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \pi$, **(B)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(C)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(D)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo (non improprio), **(B)** un fuoco, **(C)** un nodo improprio, **(D)** un centro.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) non definito, **(B)** negativo, **(C)** positivo, **(D)** nullo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) tutto $\mathbb{R}$, **(B)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(C)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(D)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) 0, **(B)** $\log 3$, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** $\frac{1}{3}$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) pari, **(B)** costante, **(C)** periodica, **(D)** dispari.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(B)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(C)** f può esistere ma sicuramente non è continua, **(D)** f non può esistere.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: BBAD CAAB CDDC

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$
(A) non esiste, **(B)** vale $+\infty$, **(C)** vale 0, **(D)** vale 1.

2. Per la funzione $f(x,y) = \sin x + \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) non è un punto critico, **(B)** è un punto sella, **(C)** è un massimo locale, **(D)** è un minimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) π, **(B)** 1, **(C)** $\frac{1}{2}$, **(D)** 0.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = e^{-kx}$ converge uniformemente?
(A) $[-1,1]$, **(B)** $[1,+\infty)$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** nessuno di questi.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(B)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(C)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(D)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \log(x^2+1)\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \pi$, **(B)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(C)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(D)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo (non improprio), **(B)** un centro, **(C)** un fuoco, **(D)** un nodo improprio.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) positivo, **(B)** nullo, **(C)** negativo, **(D)** non definito.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 0. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(B)** tutto $\mathbb{R}$, **(C)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(D)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** $e^5 - e^1$, **(C)** 0, **(D)** $\log 3$.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) periodica, **(B)** dispari, **(C)** pari, **(D)** costante.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può esistere ma sicuramente non è continua, **(B)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(C)** f non può esistere, **(D)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: DAAC DCBB CBDA

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4}{x^2+y^2}$$
(A) vale 1, **(B)** vale 0, **(C)** vale $+\infty$, **(D)** non esiste.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x - \cos y$ il punto $(0,0)$ **(A)** è un massimo locale, **(B)** è un punto sella, **(C)** è un minimo locale, **(D)** non è un punto critico.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) 1, **(B)** 0, **(C)** $\frac{1}{2}$, **(D)** π.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = \frac{x^2}{k}$ converge uniformemente?
(A) $[1,+\infty)$, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** nessuno di questi.

5. La serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente, **(B)** converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(C)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(D)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \sqrt{x^2+1}\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(B)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$, **(C)** $y(x) = \pi$, **(D)** $y(x) = 4\operatorname{arctg}(x^4+1)\cos x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un fuoco, **(B)** un centro, **(C)** un nodo (non improprio), **(D)** un nodo improprio.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) negativo, **(B)** nullo, **(C)** positivo, **(D)** non definito.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$, **(B)** limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(C)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(D)** tutto $\mathbb{R}$.

10. Il $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** $\log 3$, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** 0.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) costante, **(B)** dispari, **(C)** periodica, **(D)** pari.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(B)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(C)** f non può esistere, **(D)** f può esistere ma sicuramente non è continua.

Analisi Matematica 2 e Complementi
Scheda di preparazione n.3 – 31 marzo 2010
Ingegneria, a.a. 2009-2010

cognome _____ nome _____ matricola _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
risposte:												

codice compito: CDBA DACB ACBD

Il tempo previsto per la risoluzione della scheda è di 30 minuti.
Il punteggio base è di 12 punti. Ogni risposta corretta vale un punto. Il punteggio (negativo) per le risposte sbagliate va ricavato dalla tabella:

risposte sbagliate:	0	1	2	3	4	5 o più
punteggio:	0	0	-1	-2	-4	-8

1. Il limite
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4}{x^2+y^2}$$
(A) vale 1, **(B)** non esiste, **(C)** vale 0, **(D)** vale $+\infty$.

2. Per la funzione $f(x,y) = \cos x - \cos y$ il punto $(0,0)$
(A) non è un punto critico, **(B)** è un massimo locale, **(C)** è un punto sella, **(D)** è un minimo locale.

3. Calcolare $\int_\gamma y\,dx - x\,dy$ con $\gamma(t) = (0,t)$, $t \in [0,1]$. Il risultato è:
(A) π, **(B)** 1, **(C)** 0, **(D)** $\frac{1}{2}$.

4. Su quale dei seguenti intervalli la successione $f_k(x) = \frac{x^2}{k}$ converge uniformemente?
(A) nessuno di questi, **(B)** $[-1,1]$, **(C)** $(-\infty,-1]$, **(D)** $[1,+\infty)$.

5. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(x+k)}{k^2}$
(A) converge uniformemente su $[0,1]$ ma non totalmente, **(B)** converge totalmente su tutto $\mathbb{R}$, **(C)** converge totalmente su $[0,1]$ ma non su tutto $\mathbb{R}$, **(D)** converge puntualmente su $[0,1]$ ma non uniformemente.

6. Si consideri l'equazione differenziale $y'(x) = \sqrt{x^2+1}\sin^2 y$. Quale delle seguenti funzioni è soluzione?
(A) $y(x) = \pi$, **(B)** $y(x) = \log(x^2+1)\sin x$, **(C)** $y(x) = 4\,\mathrm{arctg}(x^4+1)\cos x$, **(D)** $y(x) = \sqrt{x^2+1}\sin x$.

7. Il sistema
$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$$
nel punto $(0,0)$ ha
(A) un nodo (non improprio), **(B)** un centro, **(C)** un nodo improprio, **(D)** un fuoco.

8. L'integrale
$$\iint_D x^2 - y^2\,dx\,dy$$
sul dominio $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2+y^2 \le 1\}$ è
(A) non definito, **(B)** nullo, **(C)** negativo, **(D)** positivo.

9. Si consideri la soluzione del problema di Cauchy
$$\begin{cases} y'(x) = y^2 - 1 \\ y(0) = 2. \end{cases}$$
L'intervallo massimale di esistenza è
(A) limitato a sinistra e illimitato a destra: $(a,+\infty)$, **(B)** tutto $\mathbb{R}$, **(C)** limitato sia a destra che a sinistra: (a,b), **(D)** limitato a destra e illimitato a sinistra: $(-\infty,b)$.

10. Il $\lim_{n\to\infty} \int_1^5 n^8 e^{-nx^3}\,dx$ vale
(A) $\frac{1}{3}$, **(B)** $\log 3$, **(C)** $e^5 - e^1$, **(D)** 0.

11. La soluzione massimale di $\begin{cases} y' = x^2 e^{y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ è una funzione
(A) costante, **(B)** dispari, **(C)** periodica, **(D)** pari.

12. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione tale che per ogni $v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ si ha
$$\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1^2 + v_2.$$
(A) f non può esistere, **(B)** f può essere continua ma sicuramente non è derivabile, **(C)** f può essere derivabile ma sicuramente non è differenziabile, **(D)** f può esistere ma sicuramente non è continua.