

## equazioni differenziali

1. **1**

Sia  $u(x)$  tale che

$$\begin{cases} u' - 2xu + 2x = 0 \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

Quanto vale  $u(1)$ ?

- $1 - e$  ✓
- $e - 1$
- $e$
- $1 + e$

2. **2**

Sia  $u(x)$  tale che

$$\begin{cases} u' = xe^u \\ u(0) = \ln 2. \end{cases}$$

Quanto vale  $u\left(\frac{1}{2}\right)$ ?

- $\ln \frac{3}{2}$
- $\ln \frac{3}{2} \sqrt{2}$  ✓
- $\ln \frac{3}{2}$
- $\ln \frac{3}{2\sqrt{2}}$

3. **3**

Sia  $u(x)$  tale che

$$\begin{cases} u'''' - 2u'' + u = e^x \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = \frac{7}{8}, \quad u''(0) = -2, \quad u'''(0) = \frac{27}{8} \end{cases}$$

Quanto vale  $u(1)$ ?

- $\frac{1}{e}$  ✓
- $e$
- $e^2 - e$
- $1 - e$

4. 4

Sia  $u(x)$  tale che

$$\begin{cases} u'' + u = \sin(x + 1), \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$$

Quanto vale  $u(\pi)$ ?

- $\frac{\pi}{2} \cos 1$  ✓
- $\frac{\pi}{2 \cos 1}$
- $\pi \cos 1 - \sin 1$
- $\frac{\cos 1}{2\pi}$