

UN CRITERIO GENERALE DI DIAGONALIZZABILITÀ'

(21/12/2016)

In questo note brevissima verrà presentata una dimostrazione semplice del criterio generale di diagonalizzabilità, già contenuto in un altro contributo.

TEOREMA: Se X è uno spazio di dimensione finita non nullo. Detti allora $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ i suoi autovalori e $A^{\lambda_1}, \dots, A^{\lambda_k}$ i relativi autospazi, si ha che
 A è diagonalizzabile se e solo se $\sum_{i=1}^k \dim A^{\lambda_i} = \dim X$

DIM.

C.N. A diagonalizzabile $\Rightarrow \sum \dim A^{\lambda_i} = \dim X$.

Infatti, sia u_1, \dots, u_n una base spettrale, che esiste per ipotesi, e raggruppando insieme gli autovettori relativi al medesimo autovalore:

$u_1^1, \dots, u_{n_1}^1 \in A^{\lambda_1}, u_1^2, \dots, u_{n_2}^2 \in A^{\lambda_2}, \dots, u_1^k, \dots, u_{n_k}^k \in A^{\lambda_k}$. Il loro numero totale è $\dim X$, e dunque

$$\sum_1^k n_i = \dim X$$

Inoltre, essendo elementi di una base, sono indipendenti e, per il teorema sul massimo numero di vettori indipendenti, ne segue $n_1 \leq \dim A^{\lambda_1}, n_2 \leq \dim A^{\lambda_2}, \dots, n_k \leq \dim A^{\lambda_k}$.

Dunque:

$$\dim X = \sum_{i=1}^k n_i \leq \sum_{i=1}^k \dim A^{\lambda_i}$$

D'altra parte, la somma degli autospazi (distinti) A^{λ_i} è diretta, e dunque $\sum \dim A^{\lambda_i} = \dim \bigoplus A^{\lambda_i}$. Inoltre $\bigoplus A^{\lambda_i} \subseteq X$, 1

da cui, infine

$$\dim \bigoplus A^{\lambda_i} \leq \dim X$$

in quanto la somma degli autospazi è un sottospazio di X , e la sua dimensione è non maggiore di quella di X . ✓

C. S. $\sum \dim A^{\lambda_i} = \dim X \Rightarrow A$ diagonalizzabile

Infatti, stessi $u_1^1, \dots, u_{n_1}^1, u_1^2, \dots, u_{n_2}^2, \dots, u_1^k, \dots, u_{n_k}^k$ delle basi anteriori di $A^{\lambda_1}, A^{\lambda_2}, \dots, A^{\lambda_k}$, rispettivamente. Poiché A^{λ_i} sono tutti autospazi e i vettori u_j^i sono tutti non nulli in quanto membri di base, essi sono autovettori di A . Per ipotesi, il loro numero è $\dim X$. Sono inoltre indipendenti poiché, essendo la somma d'autospazi diretti, da


$$\underbrace{\sum_{i_1=1}^{n_1} \alpha_{i_1}^1 u_{i_1}^1 + \sum_{i_2=1}^{n_2} \alpha_{i_2}^2 u_{i_2}^2 + \dots + \sum_{i_k=1}^{n_k} \alpha_{i_k}^k u_{i_k}^k}_{\in A^{\lambda_1}} = 0$$
$$\underbrace{\in A^{\lambda_2}}_{\in A^{k_k}}$$

segue subito

$$\sum_{i_1=1}^{n_1} \alpha_{i_1}^1 u_{i_1}^1 = 0, \dots, \sum_{i_k=1}^{n_k} \alpha_{i_k}^k u_{i_k}^k = 0$$

e, poiché i vettori $u_1^l \dots u_{n_l}^l$ sono una base di $A^{\lambda l}$, e quindi indipendenti, si ha che tutti i coefficienti delle combinazioni lineari debbono annullarsi.

Si ottiene dunque che l'insieme dei vettori $\{u_j^i : i=1..k, j=1..n_i\}$ è un insieme di $\dim X$ autovettori indipendenti in X che, per il teorema di generatori, è una base di X .



NOTA: Il criterio ha validità generale, e non è limitato ai soli operatori su spazi complessi: non abbiamo mai adoperato il teorema fondamentale dell'algebra! Se un operatore ha autovettori reali e le somme delle dimensioni dei relativi autospazi sono pari a quella del dominio dell'operatore, esso è diagonalizzabile. Alcuni differenti si rivisiterà nei criteri più raffinati che usano le molteplicità, per i quali si rimanda al contributo precedente.