

5 aprile 2000

1. Siano  $\{p_n\}$  e  $\{q_n\}$  successioni di Cauchy in uno spazio metrico  $X$ . Dimostrare che la successione  $\{d(p_n, q_n)\}$  converge.  
(*Suggerimento* : usare la disuguaglianza triangolare).

2. Sia  $X$  uno spazio metrico.

- (a) Diciamo due successioni  $\{p_n\}$  e  $\{q_n\}$  di Cauchy in  $X$  equivalenti se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d(p_n, q_n) = 0.$$

Provare che questa è una relazione di equivalenza.

- (b) Sia  $X^*$  l'insieme delle classi di equivalenza così ottenute. Se  $P \in X^*$ ,  $Q \in X^*$ ,  $\{p_n\} \in P$ ,  $\{q_n\} \in Q$  definiamo

$$\Delta(P, Q) = \lim_{n \rightarrow +\infty} d(p_n, q_n);$$

per l'esercizio precedente questo limite esiste. Dimostrare che  $\Delta(P, Q)$  non dipende dalla scelta del rappresentante e che quindi  $\Delta$  è una distanza su  $X^*$ .

- (c) Ad ogni  $p \in X$  possiamo associare una successione di Cauchy: la successione  $\{p_n\}$  con  $p_n = p$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$ ; sia  $P_p$  l'elemento di  $X^*$  che contiene questa successione. Dimostrare che

$$\Delta(P_p, Q_q) = d(p, q)$$

per ogni  $p, q \in X$ . Quindi la funzione  $i : X \rightarrow X^*$ ,  $i(p) = P_p$ , che ad ogni  $p \in X$  associa la sua classe di equivalenza è un'isometria da  $X$  in  $X^*$  (cioè un'applicazione che conserva le distanze).

- (d) Provare che  $i(X)$  è denso in  $X^*$  e che  $i(X) = X^*$  se  $X$  è completo.

- (e) Provare che lo spazio  $X^*$  è uno spazio metrico completo.

Quindi possiamo identificare  $X$  e  $i(X)$  e considerare  $X$  immerso nello spazio metrico completo  $X^*$ . Chiamiamo  $X^*$  il *completamento* di  $X$ .