

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prova di Analisi Matematica 1

18 luglio 2017

- Scrivere subito nome e cognome e matricola sul foglio risposte e preparare il libretto sul banco per il controllo.
- Tempo 30 minuti. Durante la prova non si può uscire dall'aula.
- Non si possono consultare libri, appunti, manuali.
- Non si possono usare calcolatrici, computer di ogni genere o telefoni cellulari.
- Consegnare solo il foglio risposte.
- Le risposte valide sono **SOLO** quelle segnate sul foglio che si consegna.
- Ogni domanda ha una e una sola risposta giusta.
- N.A. significa "nessuna delle altre", mentre N.E. significa "non esiste"
- Non usare matite e/o penne rosse sul foglio risposte.
- Indicare la risposta nell'apposita maschera con una "X".
- Per effettuare correzioni, barrare tutta la linea e scrivere **CHIARAMENTE** e **INEQUIVOCABILMENTE** la risposta corretta a destra della linea stessa.

CODICE=645540

PARTE A

1. Il limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{+\infty} e^{-x/k} dx}{k}$$

vale

A: N.E. B: N.A. C: $+\infty$ D: 1 E: 0

2. Data $f(x) = x^{\log(x)}$. Allora $f'(e)$ è uguale a

A: $3e^3$ B: e^2 C: N.A.

D: $\log(2e)$ E: 1

3. La serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \log(n^3)}{n^3 + \log(n^\alpha)}$$

converge per $\alpha \geq 0$ tale che

A: $0 \leq \alpha \leq 3$ B: N.A. C: $\alpha > 1$ D: $\alpha \geq 3$ E: $1 < \alpha < 2$

4. Dire quanto vale il seguente integrale

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

A: $\log(\pi)$ B: N.A. C: $\log(\frac{\sqrt{3}}{2})$ D: 1 E: $\log(\frac{\sqrt{2}}{2})$

5. Per $m \in \mathbb{R}^+$, la retta tangente al grafico di $f(x) = \sqrt{m+x^2}$ in $x_0 = 0$ vale

A: $y(x) = 1 + mx$ B: N.A. C: $y(x) = \sqrt{m}$ D: $y(x) = -\frac{(\pi m)^2}{4}$ E: $y(x) = -\frac{1}{2}(1 + \tan^2(m))x^2$

6. L'integrale

$$\int_{-1}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

vale

A: 0 B: N.E. C: $2 - \frac{1}{e}$ D: N.A. E: e

7. Il numero di elementi dell'intersezione tra gli insiemi nel piano complesso $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1\}$ e $B = \{z \in \mathbb{C} : z = t + it, t \in \mathbb{R}\}$ è

A: 2 B: ∞ C: 0 D: 1 E: N.A.

8. Calcolare inf, sup, min e max dell'insieme $\{1/x^3, x > 0\}$

A: N.A. B: $(0, 1, N.E., 1)$ C: $(0, +\infty, N.E., N.E.)$ D: $(0, N.E., 0, N.E.)$ E: $(0, 0, N.E., N.E.)$

9. Il numero di soluzioni reali dell'equazione $x^3 - 2x^2 = -x - 1$ è

A: 1 B: 0 C: 3 D: N.A. E: 2

10. Il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{x}{x-1}} - e)$$

vale

A: N.E. B: e

C: $-e$ D: $\frac{e}{2}$ E: 0

CODICE=645540

CODICE=645540

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prova di Analisi Matematica 1

18 luglio 2017

- Scrivere subito nome e cognome e matricola sul foglio risposte e preparare il libretto sul banco per il controllo.
- Tempo 30 minuti. Durante la prova non si può uscire dall'aula.
- Non si possono consultare libri, appunti, manuali.
- Non si possono usare calcolatrici, computer di ogni genere o telefoni cellulari.
- Consegnare solo il foglio risposte.
- Le risposte valide sono **SOLO** quelle segnate sul foglio che si consegna.
- Ogni domanda ha una e una sola risposta giusta.
- N.A. significa "nessuna delle altre", mentre N.E. significa "non esiste"
- Non usare matite e/o penne rosse sul foglio risposte.
- Indicare la risposta nell'apposita maschera con una "X".
- Per effettuare correzioni, barrare tutta la linea e scrivere **CHIARAMENTE** e **INEQUIVOCABILMENTE** la risposta corretta a destra della linea stessa.

CODICE=808021

PARTE A

1. L'integrale

$$\int_{-1}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

vale

A: 0 B: $2 - \frac{1}{e}$ C: N.E. D: e E: N.A.

2. Calcolare inf, sup, min e max dell'insieme $\{1/x^3, x > 0\}$

A: (0, 0, N.E., N.E.) B: (0, $+\infty$, N.E., N.E.) C: N.A. D: (0, N.E., 0, N.E.) E: (0, 1, N.E., 1)

3. Data $f(x) = x^{\log(x)}$. Allora $f'(e)$ è uguale a

A: 1 B: N.A.

C: $3e^3$ D: e^2 E: $\log(2e)$

4. La serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \log(n^3)}{n^3 + \log(n^\alpha)}$$

converge per $\alpha \geq 0$ tale che

A: $1 < \alpha < 2$ B: $\alpha \geq 3$ C: $0 \leq \alpha \leq 3$ D: $\alpha > 1$ E: N.A.

5. Dire quanto vale il seguente integrale

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

A: N.A. B: $\log(\frac{\sqrt{2}}{2})$ C: 1 D: $\log(\pi)$ E: $\log(\frac{\sqrt{3}}{2})$

6. Il numero di soluzioni reali dell'equazione $x^3 - 2x^2 = -x - 1$ è

A: 3 B: 1 C: N.A. D: 2 E: 0

7. Il limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{+\infty} e^{-x/k} dx}{k}$$

vale

A: 0 B: 1 C: $+\infty$ D: N.E. E: N.A.

8. Il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{x}{x-1}} - e)$$

vale

A: e

B: $-e$ C: 0 D: N.E. E: $\frac{e}{2}$

9. Il numero di elementi dell'intersezione tra gli insiemi nel piano complesso $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1\}$ e $B = \{z \in \mathbb{C} : z = t + it, t \in \mathbb{R}\}$ è

A: 2 B: ∞ C: 1 D: 0 E: N.A.

10. Per $m \in \mathbb{R}^+$, la retta tangente al grafico di $f(x) = \sqrt{m + x^2}$ in $x_0 = 0$ vale

A: $y(x) = 1 + mx$ B: $y(x) = -\frac{1}{2}(1 + \tan^2(m))x^2$ C: $y(x) = -\frac{(\pi m)^2}{4}$ D: $y(x) = \sqrt{m}$
E: N.A.

CODICE=808021

CODICE=808021

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prova di Analisi Matematica 1

18 luglio 2017

- Scrivere subito nome e cognome e matricola sul foglio risposte e preparare il libretto sul banco per il controllo.
- Tempo 30 minuti. Durante la prova non si può uscire dall'aula.
- Non si possono consultare libri, appunti, manuali.
- Non si possono usare calcolatrici, computer di ogni genere o telefoni cellulari.
- Consegnare solo il foglio risposte.
- Le risposte valide sono **SOLO** quelle segnate sul foglio che si consegna.
- Ogni domanda ha una e una sola risposta giusta.
- N.A. significa "nessuna delle altre", mentre N.E. significa "non esiste"
- Non usare matite e/o penne rosse sul foglio risposte.
- Indicare la risposta nell'apposita maschera con una "X".
- Per effettuare correzioni, barrare tutta la linea e scrivere **CHIARAMENTE** e **INEQUIVOCABILMENTE** la risposta corretta a destra della linea stessa.

CODICE=624786

PARTE A

1. Il numero di elementi dell'intersezione tra gli insiemi nel piano complesso $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1\}$ e $B = \{z \in \mathbb{C} : z = t + it, t \in \mathbb{R}\}$ è

A: N.A. B: 2 C: 0 D: 1 E: ∞

2. Per $m \in \mathbb{R}^+$, la retta tangente al grafico di $f(x) = \sqrt{m + x^2}$ in $x_0 = 0$ vale

A: N.A. B: $y(x) = \sqrt{m}$ C: $y(x) = 1 + mx$ D: $y(x) = -\frac{(\pi m)^2}{4}$ E: $y(x) = -\frac{1}{2}(1 + \tan^2(m))x^2$

3. L'integrale

$$\int_{-1}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

vale

A: $2 - \frac{1}{e}$ B: N.A. C: N.E. D: e E: 0

4. Il limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{+\infty} e^{-x/k} dx}{k}$$

vale

A: N.A. B: N.E. C: $+\infty$ D: 1 E: 0

5. Il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{x}{x-1}} - e)$$

vale

A: N.E. B: e

C: 0 D: $-e$ E: $\frac{e}{2}$

6. La serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \log(n^3)}{n^3 + \log(n^\alpha)}$$

converge per $\alpha \geq 0$ tale che

A: $\alpha \geq 3$ B: $1 < \alpha < 2$ C: $0 \leq \alpha \leq 3$ D: N.A. E: $\alpha > 1$

7. Calcolare inf, sup, min e max dell'insieme $\{1/x^3, x > 0\}$

A: $(0, 1, N.E., 1)$ B: $(0, +\infty, N.E., N.E.)$ C: $(0, 0, N.E., N.E.)$ D: N.A. E: $(0, N.E., 0, N.E.)$

8. Il numero di soluzioni reali dell'equazione $x^3 - 2x^2 = -x - 1$ è

A: 3 B: 1 C: 0 D: 2 E: N.A.

9. Dire quanto vale il seguente integrale

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

A: $\log(\frac{\sqrt{3}}{2})$ B: $\log(\pi)$ C: N.A. D: 1 E: $\log(\frac{\sqrt{2}}{2})$

10. Data $f(x) = x^{(\log(x))}$. Allora $f'(e)$ è uguale a

A: 1 B: N.A.

C: e^2 D: $\log(2e)$ E: $3e^3$

CODICE=624786

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prova di Analisi Matematica 1

18 luglio 2017

- Scrivere subito nome e cognome e matricola sul foglio risposte e preparare il libretto sul banco per il controllo.
- Tempo 30 minuti. Durante la prova non si può uscire dall'aula.
- Non si possono consultare libri, appunti, manuali.
- Non si possono usare calcolatrici, computer di ogni genere o telefoni cellulari.
- Consegnare solo il foglio risposte.
- Le risposte valide sono **SOLO** quelle segnate sul foglio che si consegna.
- Ogni domanda ha una e una sola risposta giusta.
- N.A. significa "nessuna delle altre", mentre N.E. significa "non esiste"
- Non usare matite e/o penne rosse sul foglio risposte.
- Indicare la risposta nell'apposita maschera con una "X".
- Per effettuare correzioni, barrare tutta la linea e scrivere **CHIARAMENTE** e **INEQUIVOCABILMENTE** la risposta corretta a destra della linea stessa.

CODICE=864997

PARTE A

1. Dire quanto vale il seguente integrale

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

A: N.A. B: $\log(\frac{\sqrt{3}}{2})$ C: $\log(\frac{\sqrt{2}}{2})$ D: 1 E: $\log(\pi)$

2. Il limite

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{+\infty} e^{-x/k} dx}{k}$$

vale

A: 1 B: 0 C: $+\infty$ D: N.E. E: N.A.

3. Il numero di elementi dell'intersezione tra gli insiemi nel piano complesso $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1\}$ e $B = \{z \in \mathbb{C} : z = t + it, t \in \mathbb{R}\}$ è

A: N.A. B: 2 C: ∞ D: 1 E: 0

4. Data $f(x) = x^{\log(x)}$. Allora $f'(e)$ è uguale a

A: 1 B: $\log(2e)$ C: N.A.

D: e^2 E: $3e^3$

5. L'integrale

$$\int_{-1}^{\infty} e^{-|x|} dx$$

vale

A: e B: 0 C: $2 - \frac{1}{e}$ D: N.A. E: N.E.

6. Il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{x}{x-1}} - e)$$

vale

A: $\frac{e}{2}$ B: 0 C: N.E. D: e

E: -e

7. Per $m \in \mathbb{R}^+$, la retta tangente al grafico di $f(x) = \sqrt{m+x^2}$ in $x_0 = 0$ vale

A: $y(x) = -\frac{(\pi m)^2}{4}$ B: $y(x) = \sqrt{m}$ C: $y(x) = -\frac{1}{2}(1 + \tan^2(m))x^2$ D: N.A. E: $y(x) = 1 + mx$

8. Il numero di soluzioni reali dell'equazione $x^3 - 2x^2 = -x - 1$ è

A: 1 B: 0 C: 3 D: 2 E: N.A.

9. La serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \log(n^3)}{n^3 + \log(n^\alpha)}$$

converge per $\alpha \geq 0$ tale che

A: $\alpha > 1$ B: N.A. C: $1 < \alpha < 2$ D: $\alpha \geq 3$ E: $0 \leq \alpha \leq 3$

10. Calcolare inf, sup, min e max dell'insieme $\{1/x^3, x > 0\}$

A: $(0, +\infty, N.E., N.E.)$ B: $(0, 0, N.E., N.E.)$ C: $(0, 1, N.E., 1)$ D: $(0, N.E., 0, N.E.)$

E: N.A.

CODICE=864997

CODICE=645540

CODICE=808021

CODICE=624786

CODICE=864997

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prova di Analisi Matematica 1

18 luglio 2017

PARTE B

1. Si studi la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + |\sin(x)|},$$

Soluzione: La funzione è definita e continua per $x \geq 0$, dato che è rapporto di funzioni continue e il denominatore non si annulla mai, visto che $1 + |\sin(x)| \geq 1$.

Si vede immediatamente che $f(0) = 0$ e $f(x) > 0$ per $x > 0$. Dato che il denominatore è limitato, si vede altrettanto facilmente che $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$.

Possiamo scrivere

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sin(x)} & \text{per } x \in [2k\pi, (2k+1)\pi] \quad k \in \mathbb{N} \\ \frac{\sqrt{x}}{1 - \sin(x)} & \text{per } x \in [(2k+1)\pi, (2k+2)\pi] \quad k \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

I punti in cui potrebbe non essere derivabile sono $x = 0$ (per la presenza di \sqrt{x}) e $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{N}$, per la presenza del termine $|\sin(x)|$.

Se vogliamo calcolare la derivata prima, abbiamo

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x) - 2x \cos(x) + 1}{2\sqrt{x}(\sin(x) + 1)^2} & \text{per } x \in]2k\pi, (2k+1)\pi[\quad k \in \mathbb{N} \\ \frac{-\sin(x) + 2x \cos(x) + 1}{2\sqrt{x}(\sin(x) - 1)^2} & \text{per } x \in](2k+1)\pi, (2k+2)\pi[\quad k \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

Da cui si ricava che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow k\pi^+} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow k\pi^-} f'(x)$$

e quindi la funzione non risulta derivabile per $x = k\pi$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Abbiamo infatti che $\lim_{x \rightarrow k\pi} \sin(x) = 0$ e che, per $k = 1, 2, \dots$

$$\lim_{x \rightarrow k\pi^-} \cos(x) \operatorname{sgn}(\sin(x)) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow k\pi^+} \cos(x) \operatorname{sgn}(\sin(x)) = +1$$

quindi abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) > 0 \quad \lim_{x \rightarrow k\pi^-} f'(x) > 0 \quad \lim_{x \rightarrow k\pi^+} f'(x) < 0$$

che può dare una prima informazione (parziale) delle zone di crescita e decrescenza della funzione. In particolare c'è almeno un punto a derivata nulla in ogni intervallo $]k\pi, (k+1)\pi[$, per $k \geq 1$, che è un punto di minimo locale.




Figura 1: Grafico approssimativo di $f(x)$

2. Si consideri l'equazione differenziale

$$y(x)'' - \alpha^2 y(x) = e^x.$$

Si trovi la soluzione generale dell'equazione al variare del parametro $\alpha \geq 0$. **Soluzione:** Partiamo dall'equazione dell'omogenea. L'equazione associata è $\lambda^2 - \alpha^2 = 0$, che per $\alpha \neq 0$ ammette due soluzioni distinte $\lambda = \pm\alpha$, mentre per $\alpha = 0$ siamo in un caso di risonanza con due soluzioni coincidenti $\lambda = 0$. La soluzione generale dell'omogenea è quindi

$$y_0 = \begin{cases} Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x} & \alpha \neq 0; \\ A + Bx & \alpha = 0. \end{cases}$$

Per la soluzione particolare, per $\alpha \neq 1$ non c'è risonanza con la soluzione omogenea, quindi in questo caso partiamo con una soluzione particolare del tipo $y_1 = ce^x$ e determiniamo c . Si ha

$$y_1'' - \alpha^2 y_1 = c(1 - \alpha^2)e^x$$

quindi $c = \frac{1}{1-\alpha^2}$, e la soluzione particolare è $y_1 = \frac{1}{1-\alpha^2}e^x$.

Per $\alpha = 1$ proviamo con $y_1(x) = cxe^x$, ottenendo

$$y_1'' - y_1 = c(2 + x)e^x - cxe^x = 2ce^x$$

e quindi $c = 1/2$ e $y_1 = \frac{1}{2}xe^x$. In definitiva otteniamo che la soluzione generale dell'equazione differenziale è

$$y(x) = \begin{cases} Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x} + \frac{1}{1-\alpha^2}e^x & \alpha \neq 0, 1; \\ A + Bx + e^x & \alpha = 0; \\ Ae^x + Be^{-x} + \frac{1}{2}xe^x & \alpha \neq 1. \end{cases}$$

3. Trovare per quali parametri $a \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$ risulta convergente la seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin(1/n) - a}{2^{bn}}$$

Soluzione: Il numeratore è sempre limitato, per ogni valore di a , dato che $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(1/n) = 1$, quindi definitivamente

$$|n \sin(1/n) - a| < 2 + |a|.$$

Se $b > 0$, per il criterio del confronto

$$\left| \frac{n \sin(1/n) - a}{2^{bn}} \right| \leq \frac{2 + |a|}{(2^b)^n}$$

e il termine a destra è il termine generico di una serie geometrica di ragione $\frac{1}{2^b} < 1$, e quindi converge.

Se $a \neq 1$ Se $b < 0$ il numeratore converge a un valore non nulla, mentre il denominatore è numero che tende a zero al crescere di n , quindi il termine generale della serie non è infinitesimo, e la serie non converge.

Se $a = 1$ il numeratore tende a zero, ma usando lo sviluppo di Taylor si può facilmente dimostrare che

$$|n \sin(1/n) - a| = O(1/n^2)$$

e dato che il denominatore di annulla in maniera esponenziale si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{n \sin(1/n) - a}{2^{bn}} \right| = +\infty,$$

e di nuovo la condizione necessaria per la convergenza viene violata.

Riassumendo si ha che per $a \in \mathbb{R}$, $b > 0$ la serie converge, mentre per $a \in \mathbb{R}$, $b < 0$ la serie non converge

4. Si determini se esistono numeri naturali $N_0 \geq 0$ tali che la seguente serie sia convergente

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} dt$$

Soluzione: Per $n = 1$ il termine della serie è

$$\int_1^2 \frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} dt$$

ma vicino ad 1 abbiamo $\frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} \sim \frac{1}{t-1}$ che non è integrabile, quindi il termine $n = 1$ non è ben definito, di conseguenza $N_0 = 1$ va scartato.

Se proviamo $N_0 = 2$ abbiamo

$$\sum_{n=2}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} dt = \int_2^{+\infty} \frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} dt$$

e dato che il denominatore non si annulla in $[2, +\infty[$ la convergenza della serie equivale alla convergenza dell'integrale a destra. Poiché il logaritmo cresce meno di qualsiasi potenza, possiamo scegliere $1 < \alpha < 3/2$ tale che, per t molto grande, $\frac{1 + |\log(t)|}{\sqrt{t}(t-1)} < \frac{1}{t^\alpha}$, che ci garantisce che l'integrale sia convergente.

Quindi scegliendo qualsiasi $N_0 \geq 2$ la serie risulta convergente.